


Интервюта с работещи в: Германия, Ирландия, Испания, Франция, Унгария и Финландия (24 402 интервюта)
Работа на място: септември 2022 г. — февруари 2023 г. | Методология: телефон | Оценка на експозицията:
www.occideas.org

Интервюта в сектора на здравеопазването: 2 478 — представляващи

Основни експозиции на рискови фактори за ракови заболявания през последната работна седмица — работещи в сектора на здравеопазването



Фигура 1: Дял на работещите в сектора на здравеопазването, които вероятно са изложени на рискови фактори за ракови заболявания, по ниво на експозиция (%)




Източник: WES 2023, EU-OSHA | референтна съвкупност: работещи в сектора на здравеопазването.

На фигура 1 е показано, че експозицията на йонизиращо лъчение е най-често срещаното ниско ниво на експозиция, а средното и високото ниво на експозиция на формалдехид са с най-висока честота.



Фигура 2: Вероятно изложени на въздействието на формалдехид здравни работници, по ниво на експозиция и пол



Източник: WES 2023, EU-OSHA | референтна съвкупност: здравни работници, изложени на въздействието на формалдехид.

На фигура 2 е показано, че предполагаемото високо ниво на експозиция засяга по-често работещите жени, изложени на въздействието на формалдехид в сектора на здравеопазването, в сравнение с работещите мъже (48 % спрямо 31 %).

Интервюта в сектора на здравеопазването и социалните грижи 3 041 —

Експозиция на формалдеhid през последната работна седмица — работещи в сектора на здравеопазването и социалните грижи

Проучването за експозицията на работещите показва, че:

- **5,2 % от работещите в сектора на здравеопазването и социалните грижи вероятно са били изложени на въздействието на формалдеhid през предходната работна седмица.**
- Условието на обща експозиция включват **работа в лаборатории по макроскопска анатомия (38%), използване на формалдеhid или формалин за стерилизация (37%),** включително високо ниво на експозиция за 4 от 5 работещи, изпълняващи задачи, свързани със стерилизация.
- Предполагамото **високо ниво на експозиция вероятно е свързано с лоша вентилация или със слабо докладвано използване на оборудване за защита на дихателните органи.**
- **Обща вентилационна система са посочили 65 % от изложените на въздействието работници,** работещи в тези условия, когато са били попитани (таблица 1).
- По-рядко е докладвано за локална смукателна вентилация или прилежаща система за засмукване, с изключение на лабораториите по патология (63 % от работниците, изложени на въздействието на формалдеhid, съобщават, че използват лабораторна камина, смукателен шкаф или аспиратор с много отвори).
- **От 14 до 27 % от изложените работници не съобщават за нито една от изброените мерки за защита (таблица 1).**



Таблица 1: Условия на експозиция на формалдеhid в сектора на здравеопазването и социалните грижи и докладвани мерки за защита

Условия на експозиция	Възможна експозиция на което и да е ниво	Работници, които съобщават за използването на вентилация		Работници, които съобщават за използване на оборудване за защита на дихателните органи (RPE)			Работници, които не съобщават за нито една от мерките за защита
	Дял на вероятно изложените работници	Локална смукателна вентилация или прилежаща система за засмукване	Обща вентилационна система	Гумена маска за лице, оборудвана с филтър/клапан	Въздухопречиствателни респиратори с електрозахранване (PAPR)	Доставящ въздух респиратор или автономен дихателен апарат (SCBA)	Нито една от поисканите мерки за защита
Работа в лаборатория по макроскопска анатомия*	38 %	34 %	65 %	3 %	8 %	2 %	14 %
Използване на формалдеhid или формалин за стерилизация	37 %	20 %	65 %	3 %	13 %	0 %	19 %
Работа с формалдеhid, проби, консервирани в разтвор на формалдеhid (формалин), или отпадъци, съдържащи формалдеhid, в лаборатория по патология**	29 %	63 %	(не е попитано)	6 %	5 %	18 %	27 %

Източник: WES 2023, EU-OSHA | референтна съвкупност: Работещи в сектора на здравеопазването и социалните грижи, изложени на въздействието на формалдеhid.

* Примерите за работа в лаборатория по макроскопска анатомия включват извършване на дисекции, измиване на биологични тъкани, пълнене на контейнери с формалин в открити работни пространства и извършване на аутопсии.

** Лабораторията по патология е мястото, където се изследват тъкани, органи, телесни течности и се извършват аутопсии с цел изучаване и диагностициране на заболявания.

Забележка: един и същ работник може да работи при едно или повече от условията, описани през последната работна седмица; един и същ работник може да докладва различни мерки за защита за едно условие.

За повече информация вж. [пълния текст на доклада](#), неговото [резюме](#) и раздела на уебсайта на EU-OSHA, посветен на [проучването](#).

© Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, 2026 г. Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.