

Workers' Exposure Survey

Factores de riesgo de cáncer profesional en Europa

Personal sanitario y de asistencia social

Entrevistas con personas trabajadoras: Alemania, Irlanda, España, Francia, Hungría y Finlandia (24 402 entrevistas).


Fechas del trabajo de campo: de septiembre de 2022 a febrero de 2023 | Metodología: entrevista telefónica | Evaluación de la exposición: www.occideas.org

Entrevistas en el sector sanitario: 2 478, representativas de 6,9 millones de personas trabajadoras

Principales exposiciones a los factores de riesgo de cáncer en la última semana de trabajo: personal sanitario



Gráfico 1. Porcentaje de trabajadores y trabajadoras probablemente expuestos en el sector sanitario, según nivel de exposición




Fuente: Encuesta sobre la exposición del personal en 2023, EU-OSHA | Población de referencia: personal sanitario.

El gráfico 1 muestra que la exposición a la radiación ionizante es la más común a un nivel bajo, mientras que la exposición al formaldehído es la que registra la mayor prevalencia a un nivel medio y alto.



Gráfico 2. Personal sanitario probablemente expuesto al formaldehído, según nivel de exposición y sexo



Fuente: Encuesta sobre la exposición del personal en 2023, EU-OSHA | Población de referencia: personal sanitario expuesto al formaldehído.

El gráfico 2 muestra que la exposición probable a un nivel elevado afecta con mayor frecuencia a las trabajadoras expuestas al formaldehído en el sector sanitario, en comparación con los trabajadores de sexo masculino (48 % frente a 31 %).

Entrevistas en el sector de la asistencia sanitaria y social: 3 041, representativas de 12,7 millones de personas trabajadoras

Exposición al formaldehído en la última semana de trabajo: personal del sector de la asistencia sanitaria y social

La encuesta sobre la exposición del personal muestra que:

- el 5,2 % de las personas trabajadoras del sector de la asistencia sanitaria y social probablemente estuvieron expuestas al formaldehído durante la semana laboral anterior;
- las circunstancias de exposición más comunes incluyen el trabajo en laboratorios de anatomía macroscópica (38 %), el uso de formaldehído o formol para la esterilización (37 %), incluido un nivel elevado para 4 de cada 5 personas trabajadoras expuestas en tareas de esterilización.
- Es probable que la exposición estimada a un nivel elevado estuviera relacionada con una ventilación deficiente o con el escaso uso notificado de equipos de protección respiratoria.
- El sistema general de ventilación fue notificado por el 65 % de las personas trabajadoras expuestas que trabajaban en las circunstancias analizadas, cuando se les preguntó (cuadro 1).
- La ventilación local de extracción o la extracción en la propia herramienta se mencionaron con menos frecuencia, excepto en los laboratorios de patología (el 63 % del personal expuesto al formaldehído declaró utilizar una campana extractora de laboratorio, una campana de aspiración o una campana extractora de múltiples ranuras).
- Entre el 14 % y el 27 % de las personas trabajadoras expuestas declararon que no se aplicaba ninguna de las medidas de protección enumeradas (cuadro 1).



Cuadro 1. Circunstancias de exposición al formaldehído en el sector de la asistencia sanitaria y social y medidas de protección notificadas

Circunstancias de exposición	Exposición probable a cualquier nivel	Personas trabajadoras que notifican el uso de ventilación		Personas trabajadoras que notifican el uso de equipos de protección respiratoria (EPR)			Personas trabajadoras que no notifican ninguna de las medidas de protección
		Ventilación local de extracción o extracción en la propia herramienta	Sistema de ventilación general	Mascarilla de caucho provista de filtro/ cartucho	Respirador eléctrico con purificador de aire	Respirador con suministro de aire o aparato de respiración autocontenido	
	Porcentaje de personas trabajadoras probablemente expuestas						Ninguna de las medidas de protección sobre las que se pregunta
Trabajo en un laboratorio de anatomía macroscópica*	38 %	34 %	65 %	3 %	8 %	2 %	14 %
Uso de formaldehído o formol para la esterilización	37 %	20 %	65 %	3 %	13 %	0 %	19 %
Manipulación de formaldehído, muestras conservadas en solución de formaldehído (formol) o residuos que contienen formaldehído en un laboratorio de patología**	29 %	63 %	(no preguntado)	6 %	5 %	18 %	27 %

Fuente: Encuesta sobre la exposición del personal en 2023, EU-OSHA | Población de referencia: personal del sector de la asistencia sanitaria y social expuesto al formaldehído.

* Entre los ejemplos de trabajo en un laboratorio de anatomía macroscópica se incluyen la realización de disecciones, el lavado de tejidos biológicos, el llenado de recipientes con formol en espacios de trabajo abiertos y la realización de autopsias.

** Un laboratorio de patología es el lugar donde se examinan tejidos, órganos y fluidos corporales, y se realizan autopsias con el fin de estudiar y diagnosticar enfermedades.

Nota: la misma persona puede haber trabajado en una o varias de las circunstancias enumeradas en la última semana laboral, así como haber declarado diferentes medidas de protección para una misma circunstancia.

Para más información, consulte el [informe completo](#), su [resumen](#) y la sección del sitio web de la EU-OSHA dedicada a la [encuesta](#).