


Entretiens dans le secteur de la santé: 2 478 – représentant 6,9 millions de professionnels

Principales expositions aux facteurs de risque de cancer au cours de la dernière semaine de travail – professionnels de la santé



Graphique 1: Proportion de professionnels probablement exposés dans le secteur de la santé, par niveau d'exposition (%)




Source: WES 2023, EU-OSHA | population de référence: professionnels de la santé.

Le graphique 1 montre que l'exposition aux rayonnements ionisants est l'exposition la plus courante à un faible niveau, tandis que l'exposition au formaldéhyde présente la prévalence la plus élevée aux niveaux moyen et élevé.



Graphique 2: Professionnels de la santé probablement exposés au formaldéhyde, par niveau d'exposition et par sexe



Source: WES 2023, EU-OSHA | population de référence: professionnels de la santé exposés au formaldéhyde.

Le graphique 2 montre que l'exposition probable à un niveau élevé touche plus souvent les travailleurs féminins exposés au formaldéhyde dans le secteur de la santé que les travailleurs masculins (48 % contre 31 %).

Entretiens dans le secteur de la santé et des services sociaux 3 041 – représentant 12,7 millions de travailleurs

Exposition au formaldéhyde au cours de la dernière semaine de travail – professionnels de la santé et des services sociaux

L'enquête sur l'exposition des travailleurs montre que:

- **5,2 % des professionnels du secteur de la santé et des services sociaux ont probablement été exposés au formaldéhyde** au cours de la semaine de travail précédente.
- Les circonstances d'exposition courantes comprennent **le travail dans des laboratoires d'anatomie générale (38 %), l'utilisation de formaldéhyde ou de formol pour la stérilisation (37 %)**, y compris à un niveau élevé pour quatre travailleurs sur cinq exposés dans le cadre de tâches de stérilisation.
- **L'exposition estimée à un niveau élevé était probablement liée à une mauvaise ventilation ou à une utilisation peu signalée d'équipements individuels de protection respiratoire.**
- **Le système général de ventilation a été mentionné** par 65 % des travailleurs exposés travaillant dans ces circonstances, lorsqu'ils ont été interrogés (tableau 1).
- La ventilation locale par aspiration ou l'extraction à la source ont été moins fréquemment mentionnées, sauf dans les laboratoires de pathologie (63 % des travailleurs exposés au formaldéhyde ont déclaré utiliser une hotte de laboratoire, une hotte aspirante ou une hotte à fentes multiples).
- **14 à 27 % des travailleurs exposés ont déclaré n'avoir pris aucune des mesures de protection énumérées** (tableau 1).



Tableau 1: Circonstances de l'exposition au formaldéhyde dans le secteur de la santé et des services sociaux, et mesures de protection signalées

Circonstances de l'exposition	Exposition probable à n'importe quel niveau	Travailleurs déclarant utiliser un système de ventilation		Travailleurs déclarant utiliser un équipement individuel de protection respiratoire (EPR)			Travailleurs ne déclarant aucune des mesures de protection
		Ventilation locale par aspiration ou extraction à la source	Système de ventilation générale	Masque en caoutchouc équipé d'un filtre/d'une cartouche	Appareil respiratoire à adduction d'air filtré	Appareil respiratoire à arrivée d'air ou appareil respiratoire isolant (ARA)	
Travail dans un laboratoire d'anatomie macroscopique*	38 %	34 %	65 %	3 %	8 %	2 %	14 %
Utilisation de formaldéhyde ou de formol pour la stérilisation	37 %	20 %	65 %	3 %	13 %	0 %	19 %
Manipulation du formaldéhyde, d'échantillons conservés dans une solution de formaldéhyde (formol) ou de déchets contenant du formaldéhyde dans un laboratoire de pathologie**	29 %	63 %	(non demandé)	6 %	5 %	18 %	27 %

Source: WES 2023, EU-OSHA | population de référence: travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux exposés au formaldéhyde.

* Parmi les exemples de tâches effectuées dans un laboratoire d'anatomie macroscopique, on peut citer les dissections, le lavage de tissus biologiques, le remplissage de récipients avec du formol dans des espaces de travail ouverts et la réalisation d'autopsies.

** Un laboratoire de pathologie est un lieu où l'on examine des tissus, des organes et des fluides corporels, et où l'on pratique des autopsies afin d'étudier et de diagnostiquer des maladies.

Remarque: un même travailleur peut avoir travaillé dans une ou plusieurs des circonstances énumérées au cours de la dernière semaine de travail; un même travailleur peut déclarer différentes mesures de protection pour une même circonstance.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le [rapport complet](#), son [résumé](#) et la section du site web de l'EU-OSHA consacrée à l'[enquête](#).