


Pokalbiai su darbuotojais, surengti Vokietijoje, Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje ir Suomijoje (24 402 pokalbiai)
Duomenys rinkti 2022 m. rugsėjo mėn. – 2023 m. vasario mėn. | Metodika – pokalbiai telefonu | Ekspozicijos vertinimas – www.occideas.org

Pokalbiai sveikatos priežiūros sektoriuje: 2 478 reprezentatyvūs 6,9 mln. darbuotojų duomenys

Pagrindinis vėžio rizikos veiksnių poveikis sveikatos priežiūros darbuotojams per praėjusią darbo savaitę



1 diagrama. Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų, tikriausiai patyrusių ekspoziciją, dalis pagal ekspozicijos lygį (%)




Šaltinis. 2023 m. Ekspozicijos darbuotojams vertinimas, EU-OSHA | Tiriama populiacija – sveikatos priežiūros darbuotojai.

1 diagramoje parodyta, kad dažniausiai pasitaikanti žemo lygio ekspozicija yra jonizuojančiosios spinduliuotės ekspozicija, o labiausiai paplitusi vidutinio ir aukšto lygio ekspozicija – formaldehido.



2 diagrama. Sveikatos priežiūros darbuotojai, tikriausiai patiriantys formaldehido ekspoziciją (pagal ekspozicijos lygį ir lytį)



Šaltinis. 2023 m. Ekspozicijos darbuotojams vertinimas, EU-OSHA | Tiriama populiacija – sveikatos priežiūros darbuotojai, patiriantys formaldehido ekspoziciją.

Iš 2 diagramos matyti, kad tikėtiną aukšto lygio formaldehido ekspoziciją dažniau patiria moterys, dirbančios sveikatos priežiūros sektoriuje, palyginti su vyrais (atitinkamai 48 ir 31 proc.).

Pokalbiai sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sektoriuje: 3 041 reprezentatyvūs 12,7 mln. darbuotojų duomenys

Formaldehido ekspozicija, kurią sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos darbuotojai patyrė per praėjusią darbo savaitę

Iš darbuotojų ekspozicijos tyrimo matyti, kad:

- Praėjusią darbo savaitę **formaldehido ekspoziciją tikriausiai patyrė 5,2 proc. sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sektoriaus darbuotojų.**
- Dažnos ekspozicijos aplinkybės – **darbas bendrosios anatomijos laboratorijose (38 proc.), formaldehido arba formalino naudojimas sterilizacijai (37 proc.),** įskaitant aukšto lygio ekspoziciją, patiriamą 4 iš 5 darbuotojų, atliekančių su sterilizacija susijusias užduotis.
- Apskaičiuota **aukšto lygio ekspozicija greičiausiai buvo susijusi su prastu vėdinimu arba kvėpavimo takų apsaugos priemonių nenaudojimu – mažai kas nurodė naudojančios šias priemones.**
- **Ekspoziciją patiriančių darbuotojų, dirbusių tokiomis aplinkybėmis, paklausus apie bendrąją vėdinimo sistemą, šią sistemą nurodė 65 proc. darbuotojų (1 lentelė).**
- Vietinė ištraukiamoji ventiliacija arba ant įrankių sumontuota traukos sistema nurodyta rečiau, išskyrus patologijos laboratorijas (63 proc. formaldehido ekspoziciją patiriančių darbuotojų nurodė naudojančios laboratorinius traukos gaubtus, traukos spintas arba daugiaangius traukos gaubtus).
- **14–27 proc. ekspoziciją patyrusių darbuotojų nurodė, kad nenaudoja nė vienos iš išvardytų apsaugos priemonių (1 lentelė).**



1 lentelė. Formaldehido ekspozicijos aplinkybės sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sektoriuje ir nurodytos apsaugos priemonės

Ekspozicijos aplinkybės	Tikėtina įvairaus lygio ekspozicija	Darbuotojai, nurodę, kad naudoja vėdinimo priemones		Darbuotojai, nurodę, kad naudoja kvėpavimo takų apsaugos priemones			Darbuotojai, nurodę, kad nenaudoja nė vienos iš šių apsaugos priemonių
	Ekspoziciją tikriausiai patyrusių darbuotojų dalis	Vietinė ištraukiamoji ventiliacija arba ant įrankių sumontuota traukos sistema	Bendroji ventiliacijos sistema	Guminė veido kaukė su įmontuotu filtru	Elektrinis oro valymo respiratorius	Respiratorius su oro įpūtimo sistema arba autonominis kvėpavimo aparatas	Nė viena iš nurodytų apsaugos priemonių
Darbas bendrosios anatomijos laboratorijoje*	38 %	34 %	65 %	3 %	8 %	2 %	14 %
Formaldehido arba formalino naudojimas sterilizacijai	37 %	20 %	65 %	3 %	13 %	0 %	19 %
Darbas patologijos laboratorijoje prie formaldehido, formaldehido tirpale (formalin) konservuotų mėginių arba formaldehido turinčių atliekų**	29 %	63 %	(neklausta)	6 %	5 %	18 %	27 %

Šaltinis. 2023 m. Ekspozicijos darbuotojams vertinimas, EU-OSHA | Tiriama populiacija – sveikatos priežiūros darbuotojai, patiriantys formaldehido ekspoziciją.

* Darbo bendrosios anatomijos laboratorijoje pavyzdžiai: pjovimas, biologinių audinių plovimas, formalino įpylimas į indus atvirose darbo vietose ir skrodimo atlikimas.

** Patologijos laboratorija – tai laboratorija, kurioje tiriami audiniai, organai, kūno skysčiai ir atliekamas skrodimas siekiant ištirti ir diagnozuoti ligą.

Pastaba. Tas pats darbuotojas praėjusią darbo savaitę galėjo dirbti tomis pačiomis arba įvairiomis išvardytomis aplinkybėmis; tas pats darbuotojas galėjo nurodyti skirtingas apsaugos priemones esant toms pačioms aplinkybėms.

Daugiau informacijos galima rasti [išsamioje ataskaitoje](#), jos [santraukoje](#) ir EU-OSHA internetinės svetainės skirsnyje, skirtame [tyrimui](#).

© Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2026. Atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį.