


Entrevistas com trabalhadores: Alemanha, Irlanda, Espanha, França, Hungria e Finlândia (24 402 entrevistas)
 Datas do trabalho de campo: Setembro de 2022 – fevereiro de 2023 | Metodologia: telefone | Avaliação da exposição:
www.occideas.org

Entrevistas no setor dos cuidados de saúde: 2478 – representando 6,9 milhões de trabalhadores

Principais exposições a fatores de risco de cancro na última semana de trabalho — profissionais de saúde e apoio social



Figura 1: Proporção de trabalhadores provavelmente expostos no setor da saúde, por nível de exposição (%)




Fonte: WES 2023, EU-OSHA – população de referência: trabalhadores do setor da saúde.

A Figura 1 mostra que a exposição à radiação ionizante é a mais comum a níveis baixos, enquanto a exposição ao formaldeído a níveis médios e altos apresenta a maior prevalência.



Figura 2: Trabalhadores do setor da saúde provavelmente expostos ao formaldeído, por nível de exposição e género



Fonte: WES 2023, EU-OSHA – população de referência: trabalhadores do setor da saúde expostos ao formaldeído.

A figura 2 mostra que a exposição provável a um nível alto afeta mais frequentemente as trabalhadoras do sexo feminino expostas ao formaldeído no setor da saúde, em comparação com os trabalhadores do sexo masculino (48 % contra 31 %).

Entrevistas no setor da saúde e apoio social: 3041 – representando 12,7 milhões de trabalhadores

Exposição ao formaldeído na última semana de trabalho — trabalhadores do setor da saúde e apoio social

O inquérito sobre a exposição dos trabalhadores mostra que:

- **5,2 % dos trabalhadores do setor da saúde e apoio social foram provavelmente expostos ao formaldeído** durante a última semana de trabalho.
- As circunstâncias de exposição mais comuns incluem **trabalhar em laboratórios de anatomia macroscópica (38 %)** e **a utilização de formaldeído ou formalina para esterilização (37 %)**, nomeadamente em níveis altos para quatro em cada cinco trabalhadores expostos em tarefas de esterilização.
- **A exposição estimada a um nível alto esteve provavelmente relacionada com uma ventilação inadequada ou à reduzida utilização de equipamento de proteção respiratória reportada.**
- **O sistema de ventilação geral foi indicado** por 65 % dos trabalhadores expostos que trabalham nas circunstâncias em causa, quando questionados (quadro 1).
- A ventilação por exaustão localizada ou a extração acoplada aos equipamentos foram menos referidas, exceto em laboratórios de patologia (63 % dos trabalhadores expostos ao formaldeído referiram usar uma câmara de fluxo laminar, uma hotte de ventilação ou um exaustor com múltiplas aberturas).
- **14 % a 27 % dos trabalhadores expostos não referiram qualquer das medidas de proteção enumeradas** (quadro 1).



Quadro 1: Circunstâncias de exposição ao formaldeído no setor da saúde e apoio social e medidas de proteção indicadas

Circunstâncias de exposição	Exposição provável a qualquer nível	Trabalhadores que referiram a utilização de ventilação		Trabalhadores que referiram a utilização de equipamento de proteção respiratória (EPR)			Trabalhadores que não referiram qualquer medida de proteção
		Ventilação por exaustão localizada ou extração no equipamento	Sistema de ventilação geral	Máscara facial de borracha equipada com filtro/ cartucho	Respirador purificador de ar motorizado (PAPR)	Respirador com suprimento de ar ou aparelho de respiração autónomo (SCBA)	
Trabalhar num laboratório de anatomia macroscópica*	38 %	34 %	65 %	3 %	8 %	2 %	14 %
Utilização de formaldeído ou formalina para esterilização	37 %	20 %	65 %	3 %	13 %	0 %	19 %
Manuseamento de formaldeído, amostras preservadas em solução de formaldeído (formalina) ou resíduos contendo formaldeído num laboratório de patologia**	29 %	63 %	(não perguntado)	6 %	5 %	18 %	27 %

Fonte: WES 2023, EU-OSHA – população de referência: trabalhadores do setor da saúde expostos ao formaldeído.

* Exemplos de trabalho num laboratório de anatomia macroscópica incluem a realização de dissecações, a lavagem de tecidos biológicos, o enchimento de recipientes com formalina em espaços de trabalho abertos e a realização de autópsias.

** Um laboratório de patologia é o local onde se examinam os tecidos, órgãos e fluidos corporais e onde se realizam autópsias para estudar e diagnosticar doenças.

Nota: o mesmo trabalhador pode ter trabalhado numa ou mais das circunstâncias enumeradas na última semana de trabalho; o mesmo trabalhador pode fazer referência a diferentes medidas de proteção para uma circunstância.

Para mais informações, consulte o [relatório completo](#), o seu [resumo](#) e a secção Web da EU-OSHA dedicada ao [inquérito](#).

© Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2026. Reprodução autorizada mediante indicação da fonte.