

Interviuri cu lucrători: Germania, Irlanda, Spania, Franța, Ungaria și Finlanda (24 402 interviuri)


Datele activității de teren: septembrie 2022 – februarie 2023 | Metodologie: telefon | Evaluarea expunerii: www.occideas.org

Interviuri în sectorul sănătății: 2 478 – reprezentând 6,9 milioane de lucrători

Principalele expuneri la factorii de risc de cancer în ultima săptămână de lucru – lucrătorii din sectorul sănătății



Figura 1: Procentul de lucrători din sectorul sănătății probabil expuși, în funcție de nivelul de expunere (%)




Sursa: WES 2023, EU-OSHA | populația de referință: lucrători din sectorul sănătății.

Figura 1 arată că expunerea la radiații ionizante este cea mai frecventă expunere la nivel scăzut, în timp ce expunerea la formaldehidă la nivel mediu și ridicat are cea mai mare prevalență.



Figura 2: Lucrători din sectorul sănătății expuși probabil la formaldehidă, în funcție de nivelul de expunere și gen



Sursa: WES 2023, EU-OSHA | populația de referință: lucrători din sectorul sănătății expuși la formaldehidă.

Figura 2 arată că expunerea probabilă la nivel ridicat afectează mai des lucrătoarele expuse la formaldehidă în sectorul sănătății, comparativ cu lucrătorii bărbați (48 % față de 31 %).

Interviuri în sectorul sănătății și asistenței sociale: 3 041 – reprezentând 12,7 milioane de lucrători

Expunerea la formaldehidă în ultima săptămână de lucru – lucrători din sectorul sănătății și asistenței sociale

Sondajul privind expunerea lucrătorilor arată că:

- 5,2 % din lucrătorii din sectorul sănătății și asistenței sociale au fost probabil expuși la formaldehidă în cursul săptămânii de lucru precedente;
- printre circumstanțele comune de expunere se numără **lucrul în laboratoare de anatomie macroscopică** (38 %), **utilizarea formaldehidei sau a formolului pentru sterilizare** (37 %), inclusiv la nivel ridicat pentru 4 din 5 lucrători expuși în cadrul sarcinilor de sterilizare;
- expunerea estimată la nivel ridicat a fost probabil legată de ventilația deficitară sau de utilizarea redusă a echipamentelor de protecție respiratorie raportată;**
- sistemul general de ventilație a fost raportat** de 65 % din lucrătorii expuși care lucrau în aceste situații, atunci când au fost întrebați (Tabelul 1);
- sistemele locale de ventilație prin aspirație sau extracția la sursă au fost mai puțin raportate, cu excepția laboratoarelor de anatomie patologică (63 % din lucrătorii expuși la formaldehidă au raportat că utilizează o hotă de tiraj de laborator, o hotă aspirantă sau o hotă cu mai multe fante);
- 14 până la 27 % din lucrătorii expuși au declarat că nu au fost luate niciuna dintre măsurile de protecție enumerate** (Tabelul 1).



Tabel 1: Situația expunerii la formaldehidă în sectorul sănătății și asistenței sociale și măsurile de protecție raportate

Situația expunerii	Expunere probabilă la orice nivel	Lucrători care raportează utilizarea ventilației		Lucrători care raportează utilizarea echipamentului de protecție respiratorie (EPR)			Lucrători care nu au raportat nicio măsură de protecție
		Sistem local de ventilație prin aspirație sau extracție la sursă	Sistem general de ventilație	Mască de protecție din cauciuc prevăzută cu filtru/cartuș	Mască de protecție respiratorie cu purificare a aerului alimentată electric (PAPR)	Mască de protecție respiratorie alimentată cu aer sau aparat de respirație autonom (SCBA)	
Lucrul într-un laborator de anatomie macroscopică*	38 %	34 %	65 %	3 %	8 %	2 %	14 %
Utilizarea formaldehidei sau a formolului pentru sterilizare	37 %	20 %	65 %	3 %	13 %	0 %	19 %
Manipularea formaldehidei, a specimenelor conservate în soluție de formaldehidă (formol) sau a deșeurilor care conțin formaldehidă într-un laborator de anatomie patologică**	29 %	63 %	(nu s-a întrebat)	6 %	5 %	18 %	27 %

Sursa: WES 2023, EU-OSHA | populația de referință: lucrători din sectorul sănătății și asistenței sociale expuși la formaldehidă.

* Exemple de activități desfășurate într-un laborator de anatomie macroscopică includ efectuarea de disecții, spălarea de țesuturi biologice, umplerea recipientelor cu formol în spații de lucru deschise și efectuarea de autopsii.

** Un laborator de anatomie patologică este cel în care se examinează țesuturile, organele, lichidele corporale și se efectuează autopsii pentru a studia și diagnostica boala.

Notă: același lucrător ar putea lucra în una sau mai multe dintre situațiile enumerate în ultima săptămână de lucru; același lucrător ar putea raporta măsuri de protecție diferite pentru o situație.

Pentru mai multe informații, consultați [raportul complet](#), [rezumatul](#) acestuia și secțiunea web a EU-OSHA dedicată [sondajului](#).

© Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 2026. Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.