


Intervjuji delavcev: v Nemčiji, na Irskem, v Španiji, Franciji, na Madžarskem in Finskem (24.402 intervjujev)

Obdobje anketiranja: september 2022–februar 2023 | Metoda dela: telefonski intervju | Ocena izpostavljenosti: www.occideas.org

Intervjuji v dejavnosti zdravstva: 2.478 – to predstavlja 6,9 milijona delavcev

Glavna izpostavljenost dejavnikom tveganja za nastanek raka v zadnjem delovnem tednu – zdravstveni delavci


Slika 1: Delež verjetno izpostavljenih delavcev v zdravstvu, glede na raven izpostavljenosti (v %)



Vir: Raziskava EU-OSHA o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja iz leta 2023 | Referenčna populacija: zdravstveni delavci.

Iz slike 1 je razvidno, da je izpostavljenost ionizirajočemu sevanju najpogostejša nizka raven izpostavljenost, medtem ko je izpostavljenost formaldehidu najbolj razširjena izpostavljenost na srednji in visoki ravni.

Slika 2: Zdravstveni delavci, ki so verjetno izpostavljeni formaldehidu, glede na raven izpostavljenosti in spol



Vir: Raziskava EU-OSHA o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja iz leta 2023 | Referenčna populacija: zdravstveni delavci, verjetno izpostavljeni formaldehidu.

S slike 2 je razvidno, da je v zdravstvu verjetna visoka raven izpostavljenosti formaldehidu pogostejša med delavkami kot med delavci (48 % v primerjavi z 31 %).

Intervjuji v zdravstvu in socialnem varstvu: 3.041 – to predstavlja 12,7 milijona delavcev

Izpostavljenost formaldehidu v zadnjem delovnem tednu – delavci v zdravstvu in socialnem varstvu

Iz raziskave o izpostavljenosti delavcev je razvidno, da:

- **je bilo 5,2 % delavcev v zdravstvu in socialnem varstvu** v predhodnem delovnem tednu verjetno izpostavljenih formaldehidu;
- pogoste okoliščine izpostavljenosti vključujejo **delo v laboratorijih za makroskopsko anatomijo** (38 %), **uporabo formaldehida ali formalina za sterilizacijo** (37 %), vključno z visoko stopnjo izpostavljenosti štirih od petih delavcev pri sterilizacijskih nalogah;
- je bila ocenjena **izpostavljenost na visoki ravni verjetno povezana s slabim prezračevanjem ali da so anketiranci v odgovorih malo omenjali uporabo varovalne opreme za dihalo**;
- je 65 % izpostavljenih delavcev poročalo, da je bil **na voljo splošni prezračevalni sistem** (preglednica 1);
- so v odgovorih manj omenjali lokalno odsesovalno prezračevanje ali odsesavanje pri viru, razen v patoloških laboratorijih (63 % delavcev, izpostavljenih formaldehidu, je navedlo, da uporabljajo laboratorijsko napo za odsesavanje dima, komoro za odsesavanje dima ali napo z več režami);
- **14 do 27 % izpostavljenih delavcev ni omenilo nobenega izmed navedenih varnostnih ukrepov** (preglednica 1).



Preglednica 1: Okoliščine izpostavljenosti formaldehidu v zdravstvu in socialnem varstvu ter omenjeni varnostni ukrepi

Okoliščine izpostavljenosti	Verjetnost izpostavljenosti na kateri koli ravni	Delavci so omenili uporabo prezračevanja		Delavci so omenili uporabo varovalne opreme za dihalo			Delavci niso omenili nobenega izmed varnostnih ukrepov
		Lokalno odsesovalno prezračevanje ali odsesavanje pri viru	Splošni prezračevalni sistem	Gumena obrazna maska s filtrom/kartušo	Električni respirator za čiščenje zraka	Respirator z dovodom zraka ali samostojni dihalni aparat	
Delo v laboratoriju za makroskopsko anatomijo*	38 %	34 %	65 %	3 %	8 %	2 %	14 %
Uporaba formaldehida ali formalina za sterilizacijo	37 %	20 %	65 %	3 %	13 %	0 %	19 %
Ravnanje s formaldehidom, vzorci, konzerviranimi v formaldehidni raztopini (formalin), ali odpadki, ki vsebujejo formaldehid, v patološkem laboratoriju**	29 %	63 %	(ni omenjeno v vprašanju)	6 %	5 %	18 %	27 %

Vir: Raziskava EU-OSHA o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja iz leta 2023 | Referenčna populacija: delavci v zdravstvu in socialnem varstvu, izpostavljeni formaldehidu.

* Primeri dela v laboratoriju za makroskopsko anatomijo zajemajo seciranje, pranje bioloških tkiv, polnjenje posod s formalinom v odprtih delovnih prostorih in opravljanje obdukcij.

** Patološki laboratorij je laboratorij, v katerem se pregledujejo tkiva, organi in telesne tekočine ter se izvajajo obdukcije za proučevanje in diagnosticiranje bolezni.

Opomba: Isti delavec je lahko v zadnjem delovnem tednu delal v eni ali več navedenih okoliščinah. Prav tako je isti delavec lahko navedel različne varnostne ukrepe za eno okoliščino.

Več informacij je na voljo v [celotnem poročilu](#), [povzetku](#) poročila in [spletni strani EU-OSHA](#), namenjeni tej [raziskavi](#).